



Začetek vegetacije na poljih oljne ogrščice

Sodobna pridelava oljne ogrščice zahteva intenzivno tehnologijo. Eden od pomembnih delov agrotehnike je učinkovito varstvo. Prvi spomladanski opravili na poljih oljne ogrščice sta dognojevanje in zgodnja zaščita pred škodljivci in povzročitelji bolezni.

Razvoj socvetja oljne ogrščice se začne že zgodaj spomladi. V tem obdobju je pomembna zaščita pred boleznimi in pravilna regulacija rasti rastlin. Zato je izberemo sredstvo, ki ima fungicidno delovanje in hkrati regulira rast (boljša razvejanost) rastline.

Folicur®

Folicur je že dolgo preizkušen pripravek za zaščito oljne ogrščice. Spomladi ga uporabljamo v odmerku 0,75-1,0 l/ha po začetku vegetacije oljne ogrščice (ko cvetno steblo izstopi iz rozete). Za uporabo fungicida je nujno, da so rastline v fazi intenzivne rasti.

Dnevne temperature naj bodo nad 10 - 12°C. Folicur pozitivno vpliva na rast oljne ogrščice, saj posevki po škropljenju ostanejo zdravi, rast je kompakna, stebila postanejo močna in spodbudi se rast stranskih poganjkov. Folicur se lahko meša z ostalimi fitofarmaceutskimi pripravki, kot je insekticid Decis (0,3 l/ha) in tudi z borovimi listnimi gnojili.

